TEMPERAME

A Ex tertio eſt ordine deſiccantiū,id quod am
dimus,facilè monſtrat.

VIRES. EX DI

Facit ad maligna & phagedænica ulcera tri

EX GA

Ad maligna & phagedænica ulcera, ea ut
Paulus.

APPEN

Experimento comprobatū eſt radicem ha
bribus,quod ſudorē uehementer moueat,ſi i
Nec minori efficacia bibitur à mulieribus qua
ercent. Valet etiam unicè ad enecandos lumb
difficultate laborant. Ducit urinā & menſes.
ad reliquas cutis fœditates. Hęc uerò poſſe,am
ius quidem hæ ſunt facultates, ut ex ijs quæ ſa
de ſimpl. medi. facult. cap. xvij. fuſius docet,m

DE PERICLYMENO

NOMIN

EPIKAYMENON Græcis, Volu
Syluæ mater,uulgo Caprifoliū &
ter ſpinas dicitur. Germanis Gey
& Jeunling. Sic ſanè dictum, qu
B bores aut frutices uocet.

FORMA.

Simplex frutex eſt, ex interuallis folia ſparg
da, Hederę ſimilia: flores candidos, Fabę ſimile
cumbentes: ſemen durum, & quod difficilè ue
qua quidem deſcriptione perſpicuū fit, frutice
riclymenon: ſiquidem caulibus ſuis uicina amp
bilicata folia habens, à terra cæſijs, ſupernè herb
albos, Fabæ non diſſimiles, ſubrotundos, potiſ
hederaceas aut Ruſci, radicem craſſam.

LOCVS.

Naſcitur in aruis ac ſepibus, conuoluens ſe
etiam paſsim plantatur.

TEMPVS

Floret Iunio & Iulio menſibus.

TEMPERAME

Vehementer calefacit & deſiccat, id quod gu
ſiquidem acrimoniam quandam præ ſe ferunt g

VIRES. EX DI

Huius ſemen poſtquā maturuit collectū, &
datur in uino quadraginta diebus, ut lienē min
tiat. Orthopnœę & ſingultui prodeſt. Vrinā ci
rat. Habent eaſdem uires & folia: quæ trigintat
re produntur. In periodicis febribus cum oleo i

EX GA

Periclymeni utilis eſt tum fructus, tum folia

PETASITES

Peſtilentzwurtzel.